

# ARMERO 70 WG

## INSECTICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

### COMPOSICIÓN

IMIDACLOPRID

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	NEONICOTINOIDE
USOS	Insecticida
CATEGORÍA IRAC	4A

### MODO DE ACCIÓN

**ARMERO® 70 WG** actúa por ingestión. Estimula la liberación del ácido Gamma Aminobutrico (GABA) en los artrópodos inhibiendo la transmisión neuromuscular. Los insectos y áreas sensibles al imidacloprid son paralizados y mueren.

#### USOS PARA COSTA RICA:

#### USOS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i> Chile <i>Capsicum annum</i> Melón <i>Cucumis melo</i> Sandía <i>Citrullus lanatus</i> Ornamentales	Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i> Áfido <i>Myzus persicae</i>	500g/ha
Plátano <i>Musa paradisiaca</i>	Picudo negro <i>Cosmopolites sordidus</i>	0.35g/planta

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.