

FLUZAMEX 24 EC

HERBICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

OXYFLUORFEN 240 g/L

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	DIFENIL ÉTER
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Herbicida
GRUPO HRAC	14

MODO DE ACCIÓN

FLUZAMEX ® 24 EC es un herbicida que actúa por contacto, es selectivo y post emergente. Su efecto inhibe la protoporfirinogeno-9-oxidasa, una enzima de los cloroplastos, que participa en la captura de la luz. La inhibición de la enzima causa la liberación y acumulación de protoporfirina a través de las células, provocando disrupción de la membrana celular, por lo que se afecta su organización, permeabilidad y el transporte de iones. Esto acarrea graves consecuencias para la célula, que se traducen en alteración del sistema fotosintético de la maleza, provocando necrosis del tejido foliar, desecación y más tarde la muerte.

USOS PARA COSTA RICA:

USOS		
CULTIVO	MALEZA	DOSIS
Plátano y banano <i>Musa sp</i> Café <i>Coffea arabica</i> Aguacate <i>Persea americana</i> Brócoli <i>Brassica oleracea var. itálica</i> Repollo <i>Brassica oleracea var. capitata</i> Coliflor <i>Brassica oleracea var. botrytis</i> ORNAMENTALES	Malva <i>Malva spp</i> Cerrajilla <i>Sonchus oleraceus</i> Bledo <i>Amaranthus spp</i> Hierba mora <i>Solanum nigrum</i> Pata de gallina <i>Eleusine indica</i> Escobilla <i>Sida spp</i> Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i>	2.5 – 3.0L/ha (1.75 – 2.1L/mz) la dosis más pequeña es para malezas de 10cm o menos y la dosis mayor para malezas entre 20 – 25cm y para una mayor residualidad.
Piña <i>Ananas comosus</i>	Diente de león <i>Taraxacum officinale</i> Arrocillo <i>Digitaria sanguinalis</i> Churristate <i>Ipomea spp</i> Moriseco <i>Bidens pilosa</i> Acedera <i>Oxalis corniculata</i> Mielcilla <i>Galinsoga ciliata</i> Coyolillo <i>Cyperus pp</i> Cola de zorro <i>Setaria viridis</i> Canutillo <i>Commelina difusa</i> Farolillo chino <i>Physalis angulata</i> Navillo <i>Brassica campestris</i> Chiquizacillo <i>Richardia scabra</i> Santa Lucia <i>Ageratum conyzoides</i> Zacate guinea <i>Panicum máximum</i> Cardosanto <i>Argemone mexicana</i> Botón de oro <i>Melampodium divaricatum</i> Ojo chino <i>Mitracarpus sp</i> Zacate de fuego <i>Ixophorus unisetu</i> Caminadora <i>Rottboellia exaltata</i> Arrocillo <i>Echinochloa sp</i>	3.0 – 5.0L/ha (2.1 – 3.5L/mz) puede utilizarse una cantidad de agua de 3000L/ha.

PRESENTACIONES

20L, 1L, 250ml, 500ml

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de DISAGRO®.